



Endoscopia de Carson City

1385 Vista Lane

Carson City, Nevada 89703

775-884-4567

Instrucciones para el paciente para someterse a una endoscopia con cápsula de permeabilidad

Nombre del paciente: _____ Día de la cita: _____

Hora de llegada: _____ Hora de la cita: _____

Su médico ha determinado que, como parte de su evaluación médica, debe someterse a un examen conocido como endoscopia con cápsula de permeabilidad. Este procedimiento consiste en ingerir una pequeña cápsula, que tiene aproximadamente el tamaño de una vitamina grande.

La cápsula de permeabilidad se usa para evaluar si podrá pasar una cápsula de tamaño similar que pueda tomar fotografías a medida que pasa por su sistema digestivo. La cápsula de permeabilidad también se puede usar para evaluar cualquier estrechamiento en su sistema digestivo que pueda requerir cirugía.

La cápsula de permeabilidad comenzará a disolverse 30 horas después de que la ingiera. Se le solicitará una radiografía abdominal de 28 a 30 horas después de ingerir la cápsula de permeabilidad para identificar si se ha pasado la cápsula.

Para que su médico obtenga la información más precisa de este examen, deberá seguir las instrucciones a continuación:

Día antes de la endoscopia con cápsula de permeabilidad

- NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO DESPUÉS DEL ALMUERZO
- COMIENCE UNA DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS DESPUÉS DEL ALMUERZO (Ejemplos: agua, jugos de frutas claros (sin pulpa), refrescos, sopas y caldos colados, Jell-I, paletas heladas, café solo o té y salvavidas)

- Continúe bebiendo muchos líquidos claros durante la tarde.
- Detenga su dieta de líquidos claros 10 horas antes de su prueba. Los medicamentos se pueden tomar con un sorbo de agua hasta 2 horas antes de la prueba

Día de la endoscopia de la cápsula de permeabilidad: antes de la prueba

- El día de la prueba de permeabilidad, continúe en ayunas y llegue puntualmente a su cita
- NO TOME NINGÚN LÍQUIDO O MEDICAMENTO 2 HORAS ANTES DE LA PRUEBA

Día de la Endoscopia de Cápsula de Permeabilidad-Después de la Prueba

- Después de ingerir la cápsula, NO COMA NI BEBA DURANTE OTRAS 2 HORAS •
- Después de 4 horas, puede tomar un refrigerio ligero, después de eso puede volver a una dieta normal

Día después de la endoscopia de la cápsula de permeabilidad

- Radiografía abdominal completa 28 a 30 horas después de ingerir la cápsula