



Instrucciones para el paciente para someterse a una cápsula endoscópica

Su médico ha determinado que, como parte de su evaluación médica, debe someterse a un examen conocido como cápsula endoscópica. Este procedimiento consiste en ingerir una cápsula pequeña (del tamaño de una píldora de vitamina grande) de Given Imaging M2A, que pasará naturalmente a través de su sistema digestivo mientras toma imágenes de los intestinos. Las imágenes se transmiten al SensorArray que se coloca en su abdomen. La matriz de sensores. está conectado a un registrador de datos dado similar a un walkman que guarda todas las imágenes. Está ubicado en el RecorderBelt, que se usa alrededor de la cintura. Después de 8 horas, deberá regresar con su médico para procesar la información. La Cápsula M2A es desechable y se excretará naturalmente en su evacuación intestinal. En el raro caso de que no se elimine de forma natural, será necesario extirparlo por vía endoscópica o quirúrgica. Para que su médico obtenga la información más precisa de este examen, deberá seguir las instrucciones a continuación:

Día antes de la cápsula endoscópica

1. El día anterior al examen con cápsula endoscópica, comience su dieta de líquidos claros con el desayuno. Líquidos claros: agua, jugos de frutas claros (sin rojo ni morado), refrescos (sin rojo ni morado), sopas coladas y caldo, gelatina (sin rojo ni morado), paletas heladas (sin rojo ni morado), café y té. Sin crema, leche y sin alimentos sólidos.
2. Después del desayuno, mezcle la solución de preparación de acuerdo con las instrucciones del envase y colóquela en el refrigerador.
3. A las 2:00 p. m. comience a beber la solución laxante. Debe beber 8 onzas cada 10-15 minutos hasta que haya consumido "la mitad" de la solución. Puede descartar el resto. Es mejor beber cada vaso rápidamente en lugar de sorberlo. Beber la solución con una pajilla puede ser más fácil. Si desarrolla vómitos durante la preparación, deténgase temporalmente durante una hora y luego reanude. Puede ayudar a reducir la velocidad a la que bebe la solución. Si el vómito persiste, suspenda la preparación y llame a nuestra oficina o al médico de guardia para recibir instrucciones. Dos horas después de beber la solución, puede reanudar su dieta de líquidos claros.
4. A partir de las 10:00 p. m. de la noche anterior a la cápsula endoscópica, no coma ni beba excepto los medicamentos necesarios con un sorbo de agua.
5. No tome ningún medicamento desde 2 horas antes de la cápsula endoscópica.
6. Abstenerse de fumar 24 horas antes de someterse a una cápsula endoscópica. 7. Los pacientes masculinos deben afeitarse el abdomen 6 pulgadas (15 cm) por encima y por debajo del ombligo el día del examen.

El día de la cápsula endoscópica 1.

Llegue al consultorio de su médico a la hora prescrita para su cápsula endoscópica vestido con ropa holgada de dos piezas.

2. En el consultorio de su médico tendrá una entrevista previa al procedimiento. Durante esta entrevista, se le debe informar que la cápsula endoscópica está asociada con una pequeña posibilidad de obstrucción intestinal. Se le registrará y se le pedirá que dé su consentimiento informado.
3. El SensorArray se aplicará a su abdomen con almohadillas adhesivas y se conectará al DataRecorder, que llevará en un cinturón alrededor de su cintura. Después de eso, se le indicará que ingiera la Cápsula M2A.

Después de ingerir la Cápsula M2A 1. Después

de ingerir la Cápsula M2A, no coma ni beba durante al menos 2 horas. Después de 4 horas, puede tomar un refrigerio ligero. Una vez finalizado el examen, puede volver a su dieta normal. Se aplican las instrucciones anteriores relacionadas con la alimentación, a menos que su médico especifique lo contrario. Comuníquese con su médico de inmediato si sufre dolor abdominal, náuseas o vómitos durante la cápsula endoscópica.

2. Después de ingerir la Cápsula M2A y hasta que se excrete, no debe estar cerca de ninguna fuente de campos electromagnéticos potentes, como los que se crean cerca de un dispositivo de resonancia magnética o un radioaficionado (aficionado).

3. Ocasionalmente, algunas imágenes pueden perderse debido a interferencias de radio (p. ej., de un transmisor de radioaficionado, MRI, etc.). En raras ocasiones, esto puede resultar en la necesidad de repetir el examen de cápsula endoscópica.

En este caso, el médico le recomendará que permanezca dentro de las instalaciones de la clínica durante la Cápsula Endoscópica para evitar que este problema se repita.

4. La cápsula endoscópica dura aproximadamente 8 horas y se considera completa de acuerdo con las instrucciones de su médico. No desconecte el equipo ni se quite el cinturón en ningún momento durante este período. Dado que el registrador de datos es en realidad una computadora pequeña, debe tratarse con sumo cuidado y protección. Evite movimientos repentinos y golpes del registrador de datos.

5. Durante la cápsula endoscópica, deberá verificar cada 15 minutos que la pequeña luz en la parte superior del registrador de datos parpadee dos veces por segundo. Si por alguna razón deja de parpadear a este ritmo, registre la hora y comuníquese con su médico.

6. Evite cualquier actividad física extenuante, especialmente si implica sudoración, y no se incline ni se incline durante la cápsula endoscópica.

7. Después de ingerir la Cápsula M2A, y hasta que se excrete, no debe estar cerca de ninguna fuente de campos electromagnéticos potentes, como los creados por un dispositivo de resonancia magnética o radioaficionados.

8. Ocasionalmente, algunas imágenes se pierden debido a interferencias de radio, de transmisores de radioaficionados, resonancias magnéticas, etc. En raras ocasiones, esto puede resultar en la necesidad de repetir el examen de cápsula endoscópica.

9. Someterse a una resonancia magnética mientras la cápsula está dentro de su cuerpo puede provocar daños graves en el tracto intestinal o la cavidad abdominal. Si no verificó positivamente la excreción de la cápsula de su cuerpo, debe comunicarse con su médico para una evaluación y una posible radiografía antes de someterse a un examen de resonancia magnética.

10. Si no verifica positivamente la excreción de la cápsula y desarrolla náuseas, dolor abdominal o vómitos después del procedimiento sin explicación, comuníquese con su médico para una evaluación y un posible examen de rayos X abdominal.